

ІНСЕКТОСТОП для собак та котів
(розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення)
листівка-вкладка

Опис

Розчин для зовнішнього застосування у вигляді прозорої маслянистої рідини зі специфічним запахом.

Склад

1 ml (мл) препарату містять діючу речовину:

фіпроніл - 100 mg (мг).

Допоміжні речовини: пропіленкарбонат, спирт ізопропіловий, кислота лимонна, поліетиленгліколь-400.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP53, ектопаразитоциди, інсектициди і репеленти (QP53AX15, фіпроніл).

Діюча речовина препарату фіпроніл (Fipronilum) - 5-аміно-1-[2,6-дихлоро-4-(трифлуорометил)феніл]-4-[(трифлуорометил)сульфініл] -1 Н-піразол-3-карбонітрил, похідне фенілпіразолу.

Фіпроніл уражає центральну нервову систему ектопаразитів, не впливаючи на центральну нервову систему ссавців. Механізм дії фіпронілу у безхребетних полягає в тому, що препарат гальмує проходження іонів хлору в ГАМК-залежних рецепторах ектопаразитів, порушує передачу нервових імпульсів та діяльність нервової системи, викликаючи загибель ектопаразитів.

Фіпроніл має контактну дію і практично не всмоктується через шкіру. Він накопичується в епідермісі, сальних залозах волосяних фолікул і поступово вивільняється протягом певного часу. Створюється ефект "резервуару", що забезпечує тривалу залишкову активність фіпронілу.

Після місцевого нанесення препарат розподіляється по поверхні тіла протягом 24 годин. Препарат є токсичним для риб і бджіл!

Застосування

Профілактика і лікування собак та котів при ураженні ектопаразитами: блохами (*Ctenocephalides* spp.), вошами (*Linognathus setosus*) на всіх стадіях розвитку, волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), іксодовими кліщами (*Ixodes* spp., *Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp., *Haemaphysalis* spp.).

Лікування собак та котів при ураженні саркоптиформними кліщами (*Otodectes cynotis*, *Sarcoptes scabiei* var. *canis*, *Notoedres cati*, *Cheyletiella* spp.), тромбідіформними кліщами (*Demodex canis*).

Дозування

Препарат наносять зовнішньо безпосередньо на шкіру за допомогою піпетки у місця недоступні для злизування тваринам: на ділянку холки, вздовж хребта, при ураженні вухним кліщем - на шкіру вухної раковини.

Дози препарату становлять:

- коти масою тіла від 3 до 10 kg (кг) - 0,8 ml (мл) препарату (1 піпетка) на тварину;
- собаки:

<i>Собаки масою тіла, kg (кг)</i>	<i>Доза препарату, ml (мл)</i>	<i>Кількість піпеток, шт</i>
від 3 до 10	0,8	1
від 10 до 20	1,6	2
від 20 до 40	2,4	3
більше 40	3,2	4

При отодектозі у тварин, внутрішню поверхню вушної раковини і зовнішній слуховий прохід очищують від вушної сірки, струпув та ексудату, після цього на шкіру обох вух наносять препарат, навіть при ураженні лише одного. За необхідності через 7-10 днів курс лікування повторюють під контролем мікроскопії зіскрібків.

При саркоптозі, нотоєдросі, демодектозі та хейлетіозі препарат застосовують 2-4 рази з інтервалом 7-10 днів. Лікування рекомендується проводити комплексно із застосуванням етіотропних, патогенетичних і симптоматичних засобів.

Одноразова обробка препаратом попереджує ураження кліщами протягом 3 тижнів, а блохами до 4 тижнів.

Для запобігання повторної інвазії тварин ектопаразитами необхідно періодично обробляти підстилки інсектицидними засобами.

Протипоказання

Не застосовувати препарат тваринам, віком до 10 тижнів!

Не застосовувати препарат хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати тваринам з індивідуальною підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Застосування препарату тваринам під час вагітності і лактації ґрунтується на оцінці ризику та необхідності проведення обробки лікарем ветеринарної медицини!

Застереження

Важливо переконатися, що препарат нанесений на ділянки тіла, які недоступні для злизування твариною.

Не допускати можливості облизування тваринами одне одного після обробки ветеринарним лікарським засобом.

Не рекомендують купати тварин впродовж 2-х днів після обробки ветеринарним препаратом.

Блохи від домашніх тварин часто інфікують спальні місця та інші місця перебування тварин такі як, килими і м'які меблі, тому їх необхідно періодично чистити і обробляти відповідними інсектицидними засобами.

Людам із гіперчутливістю до інсектицидів або спирту не рекомендують обробляти тварин препаратом.

При випадковому попаданні препарату в очі необхідно обережно промити їх чистою водою.

Після обробки тварин препаратом, необхідно ретельно вимити руки водою з милом.

Під час роботи з препаратом забороняється пити, вживати їжу або палити.

Після обробки препаратом тварин необхідно утримувати окремо до повного висихання і не допускати до них маленьких дітей.

Форма випуску

Полімерні піпетки по 0,8 ml (мл), упаковані у картонну коробку по 4 або 6 штук.

Зберігання

Зберігати препарат у сухому, темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 4 до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Лише для ветеринарної медицини!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»,
вул. Полтавський шлях, 115, м. Харків, 61093, Україна.
+38(057) 766-36-36

Виробник готового продукту

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»
вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, Україна.
info@provet.ua
provet.ua