

ІНСЕКТОСТОП для цуценят та котенят
(розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення)
листівка-вкладка

Опис

Розчин для зовнішнього застосування у вигляді прозорої маслянистої рідини зі специфічним запахом.

Склад

1 ml (мл) препарату містять діючу речовину:

фіпроніл - 100 mg (мг).

Допоміжні речовини: пропіленкарбонат, спирт ізопропіловий, кислота лимонна, поліетилєнглїколь-400.

Фармакологічні властивості

ATC vet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX15, фіпроніл).

Діюча речовина препарату фіпроніл (Fipronilum) - 5-аміно-1-[2,6-дихлоро-4-(трифлуорометил)феніл]-4-[(трифлуорометил)сульфініл] - 1 Н-піразол-3-карбонітрил, похідне фенілпіразолу.

Фіпроніл уражає центральну нервову систему ектопаразитів, не впливаючи на центральну нервову систему ссавців. Механізм дії фіпронілу у безхребетних полягає в тому, що препарат гальмує проходження іонів хлору в ГАМК-залежних рецепторах ектопаразитів, порушує передачу нервових імпульсів та діяльність нервової системи, викликаючи загибель ектопаразитів.

Фіпроніл має контактну дію і практично не всмоктується через шкіру. Він накопичується в епідермісі, сальних залозах волосяних фолікул і поступово вивільняється протягом певного часу. Створюється ефект "резервуару", що забезпечує тривалу залишкову активність фіпронілу.

Після місцевого нанесення препарат розподіляється по поверхні тіла протягом 24 годин.

Препарат є токсичним для риб і бджіл!

Застосування

Профілактика і лікування цуценят, котенят, котів та собак малих порід (масою тіла до 3 кг) при ураженні ектопаразитами: блохами (*Ctenocephalides* spp.), вошами (*Linognathus setosus*) на всіх стадіях розвитку, волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), іксодовими кліщами (*Ixodes* spp., *Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp., *Haemaphysalis* spp.).

Лікування собак та котів при ураженні саркоптиформними кліщами (*Otodectes cynotis*, *Sarcoptes scabiei* var. *canis*, *Notoedres cati*, *Cheyletiella* spp.), тромбідіформними кліщами (*Demodex canis*).

Дозування

Препарат наносять зовнішньо безпосередньо на шкіру за допомогою піпетки у місця недоступні для злизування тваринам: на діянку холки, вздовж хребта, при ураженні вухним кліщем - на шкіру вушної раковини.

Доза препарату становить:

цуценята, котенята, коті та собаки малих порід масою тіла від 1 до 3 kg (кг) - 1 піпетка (0,5 ml (мл)) препарату на тварину.

При отодектозі тварин внутрішню поверхню вушної раковини і зовнішній слуховий прохід очищують від вушної сірки, струпу та ексудату, після цього на шкіру обох вух наносять препарат, навіть при ураженні лише одного. За необхідності через 7-10 днів курс лікування повторюють під контролем мікроскопії зіскрібків.

При саркоптозі, нотоєдрозі, демодекозі та хейлетіозі препарат застосовують 2-4 рази з інтервалом 7-10 днів. Лікування рекомендується проводити комплексно із застосуванням етіотропних, патогенетичних і симптоматичних засобів.

Одноразова обробка препаратом попереджує ураження кліщами протягом 3 тижнів, а блохами до 4 тижнів.

Для запобігання повторної інвазії тварин ектопаразитами необхідно періодично обробляти

підстилки інсектицидними засобами.

Протипоказання

Не застосовувати препарат тваринам, віком до 10 тижнів!

Не застосовувати препарат хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати тваринам з індивідуальною підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Застосування препарату тваринам під час вагітності і лактації ґрунтується на оцінці ризику та необхідності проведення обробки лікарем ветеринарної медицини!

Застереження

Важливо переконатися, що препарат нанесений на ділянки тіла, які недоступні для слизування твариною.

Не допускати можливості облизування тваринами одне одного після обробки ветеринарним лікарським засобом.

Не рекомендують купати тварин впродовж 2-х діб після обробки ветеринарним препаратом.

Блохи від домашніх тварин часто інфікують спальні місця та інші місця перебування тварин такі як, килими і м'які меблі, тому їх необхідно періодично чистити і обробляти відповідними інсектицидними засобами. Препарат може викликати подразнення слизових оболонок, шкіри та очей. Тому не можна допускати потрапляння препарату всередину, на шкіру та в очі.

Людам із гіперчутливістю до інсектицидів або спирту не рекомендують обробляти тварин препаратом.

Не допускати потрапляння препарату на відкриті ділянки тіла (на пальці). При попаданні препарату на руки необхідно змити його водою з милом.

При випадковому попаданні препарату в очі необхідно обережно промити їх чистою водою.

Після обробки тварин препаратом необхідно ретельно вимити руки водою з милом.

Під час роботи з препаратом забороняється пити, вживати їжу або палити.

Після обробки препаратом тварин необхідно утримувати окремо до повного висихання і не допускати до них маленьких дітей.

Форма випуску

Полімерні піпетки по 0,5 ml (мл), упаковані у картонну коробку по 4 або 6 штук.

Зберігання

Зберігати препарат у сухому, темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 4 до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Лише для ветеринарної медицини!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»,

вул. Полтавський шлях, 115, м. Харків, 61093, Україна.

+38(057) 766-36-36

Виробник готового продукту

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, Україна.

info@provet.ua

provet.ua