

**ПрофіЛайн краплі протипаразитарні  
(краплі для зовнішнього застосування)  
листівка-вкладка**

**Опис**

Прозора рідина світло-жовтого кольору зі специфічним запахом.

**Склад:**

100 мл препарату містять діючі речовини:

фіпроніл – 10%;

S-метопрен – 10%.

Допоміжні речовини: пропіленгліколь-400, спирт ізопропіловий, N-метилпіролідон.

**Фармакологічні властивості**

**ATC vet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX65, фіпроніл комбінації).**

Препарат належить до комбінованих інсекто-акарицидних препаратів. Має виражену дію до преімагінальних та імагінальних фаз розвитку бліх (*Ctenocephalides* spp.), вошей (*Linognathus* spp.), волосоїдів (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*) та паразитоформних кліщів (*Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp., *Ixodes* spp.), які паразитують на тілі собак і котів.

Механізм дії фіпронілу полягає в блокуванні ГАМК-залежних рецепторів паразитів, порушенні передачі нервових імпульсів, що призводять до ураження нервової системи ектопаразитів і їх загибелі. Фіпроніл не впливає на центральну нервову систему тварин.

S-метопрен – це регулятор росту комах, що належить до класу сполук, відомих як аналоги ювенільного гормону, які пригнічують розвиток незрілих форм комах. S - метопрен порушує синтез хітину і, тим самим, пригнічує розвиток бліх на стадіях яйця, личинки і лялечки.

Овоцидна дія S-метопрену проявляється в результаті прямого проникнення в оболонку відкладених яєць.

**Застосування**

Профілактика і лікування собак та котів при захворюваннях, спричинюваних ектопаразитами: блохами (*Ctenocephalides* spp.), вошами (*Linognathus* spp.), волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*) та паразитоформними кліщами (*Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp., *Ixodes* spp.).

Профілактика та лікування собак і котів при блошиному алергічному дерматиті.

**Дозування**

Препарат застосовують зовнішньо, наносячи його безпосередньо на шкіру, у місця недоступні для слизування (ділянка холки та вздовж хребта).

Препарат наносять на суху неушкоджену шкіру. Виймають піпетку з однократною дозою і тримаючи вертикально, відкривають наконечник. Розділяють шерсть тварини і наносять препарат безпосередньо на шкіру між лопатками біля основи шиї.

Препарат застосовують різного фасування відповідно до мінімальної дози, яка залежить від маси тіла тварини.

<b>Собаки, масою тіла, кг</b>	<b>Доза препарату, мл</b>	<b>Кількість ампул- крапельниць, шт</b>
до 4	0,5	1
від 4 до 10	1,0	1
від 10 до 20	2,0	1
від 20 до 40	3,0	1
від 40 і більше	Відповідна комбінація піпеток	

<b>Коти, масою тіла, кг</b>	<b>Доза препарату, мл</b>	<b>Кількість ампул- крапельниць, шт</b>
до 4	0,5	1

від 4 до 8	1,0	1
від 8 і більше	Відповідна комбінація піпеток	

Обробки тварин проводять протягом сезонної активності паразитів за необхідності, але не частіше ніж один раз на 30 діб.

З метою профілактики тварин ураженнями ектопаразитами необхідно періодично змінювати або обробляти відповідними інсектицидними засобами підстилки для тварин та проводити регулярне прибирання місць їх перебування.

#### **Протипоказання**

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам.

Не застосовувати цуценятам та кошенятам віком до 8 тижнів.

Не застосовувати тваринам з індивідуальною підвищеною чутливістю до компонентів препарату.

Не застосовувати разом іншими інсектоакарицидними препаратами.

#### **Застереження**

При обробці тварин уникати попадання препарату в очі, на слизові оболонки, в ротову порожнину.

Не допускати контакту щойно оброблених тварин з іншими тваринами.

Після нанесення препарату впродовж доби слід уникати попадання води (дощ, купання) на місця нанесення.

Впродовж 24 годин після обробки тварин не потрібно гладити, спати з ними та дозволяти малим дітям бавитись з ними.

Часте купання тварин із використанням шампуню після обробки тварин зменшує ефективність препарату.

Повторні обробки проводять не раніше ніж через 4 тижні.

#### **Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу**

При роботі з препаратом слід дотримуватися загальних правил особистої гігієни і техніки безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами. Обробку тварин проводять з використанням гумових рукавичок. Після закінчення роботи слід ретельно вимити руки, а при потребі і рукавички, теплою водою з милом.

При випадковому попаданні препарату на шкіру, слизові оболонки або в очі їх необхідно промити великою кількістю проточної води.

#### **Форма випуску**

Полімерні піпетки або полімерні туби з полімерним ковпачком по 0,5 мл; 1,0 мл; 2,0 мл; 3,0 мл упаковані у картонні коробки по 1 шт.

#### **Зберігання**

Зберігати препарат у сухому темному місці, окремо від продуктів харчування та кормів, у недоступному для дітей і тварин місці, за температури від 0 до 30 °С.

#### **Термін придатності**

3 роки.

### **Для застосування у ветеринарній медицині!**

#### **Власник реєстраційного посвідчення:**

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

61093, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 115, Україна

#### **Виробник готового продукту:**

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

61105, м. Харків, вул. Зернова, 4, Україна