

**МЕГАСТОП для собак**  
(розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення)  
листівка-вкладка

**Опис**

Прозора масляниста рідина зі специфічним запахом складових компонентів.

**Склад**

1 мл препарату містить діючі речовини:

імідаклоприд - 100 мг;

івермектин - 25 мг.

Допоміжні речовини: N-метилпіролідон, диметилсульфоксид, поліетиленгліколь-400.

Для собак різної маси тіла відповідають піпетки різних об'ємів препарату МЕГАСТОП для собак:

Розмір піпетки	Об'єм (мл)	Імідаклоприд (мл)	Івермектин (мл)
для маленьких собак масою тіла до 4 кг	0,5	50	12,5
для середніх собак масою тіла від 4 до 10 кг	1,0	100	25
для великих собак масою тіла від 10 до 20 кг	2,0	200	50
для дуже великих собак масою тіла від 20 до 30 кг	3,0	300	75

**Фармакологічні властивості**

**АТС vet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX30, комбінації інших ектопаразитицидів для місцевого застосування)**

МЕГАСТОП для собак - ендоектопаразитицид. Фармакологічні властивості препарату зумовлені властивостями діючих речовин.

**Імідаклоприд**, діюча речовина препарату, належить до групи хлорнікотинілових сполук. Блокує постсинаптичні холінергічні рецептори, які чутливі до нікотину і розміщені у ектопаразитів у центральній нервовій системі. Переривання передачі нервового імпульсу призводить до паралічу та загибелі паразита.

Імідаклоприд має низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому практично не впливає на ЦНС ссавців.

**Івермектин** належить до сполук, що продукуються мікроорганізмами групи *Streptomyces avermitis*. Івермектин має виражену протипаразитарну дію на личинкові і статевозрілі форми нематод. Механізм дії івермектину на організм паразита полягає у тому, що він стимулює виділення нейромедіатора гальмування, гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), у пресинаптичних нейронах, який зв'язується зі спеціальними рецепторами нервових закінчень, збільшуючи проникність мембран для іонів хлору і блокуючи передачу нервово-м'язових імпульсів. Це призводить до порушення передачі нервових імпульсів, паралічу і загибелі паразитів.

**Застосування**

Профілактика та лікування тварин при ураженні блохами (*Ctenocephalides spp.*), саркоптиформними кліщами (*Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*, *Sarcoptes canis*), тромбідіформними кліщами *Demodex spp.*; профілактика дирофіляріозу (ефективний проти личинок L3 і L4 стадії *Dirofilaria immitis*).

**Дозування**

Для собак різної маси тіла використовують піпетки МЕГАСТОП для собак відповідного об'єму:

Маса тіла собак (кг)	Розмір піпетки	Об'єм (мл)	Кількість піпеток
до 4	для маленьких собак	0,5	1
від 4 до 10	для середніх собак	1,0	1
від 10 до 20	для великих собак	2,0	1
від 20 до 30	для дуже великих собак	3,0	1
від 30 і більше	Відповідна комбінація піпеток		

Препарат застосовують лише зовнішньо. Собак обробляють у стоячому положенні. Розділяють шерсть між лопатками так, щоб було видно шкіру, і наносять препарат на неушкоджену шкіру.

Розміщують вузький кінець піпетки на шкіру, міцно стискають піпетку декілька разів, витискаючи увесь вміст безпосередньо на шкіру.

Великим собакам масою тіла понад 20 кг вміст піпетки наносять у 3-4 точки вздовж хребта, починаючи між лопатками і закінчуючи біля кореня хвоста.

Впродовж 48 годин після обробки тварин не купати. Тривалість дії препарату становить 1,5 - 2 місяці.

При отодектозі, нотоєдрозі, саркоптозі та демодекозі тварин обробку проводять препаратом 2-3 рази з інтервалом у 10 діб.

#### **Протипоказання**

Не застосовують цуценятам віком до 10-ти тижнів!

Не застосовують тваринам із підвищеною чутливістю до складників препарату!

Не призначати собакам порід коллі, шелті, бобтейл і їх помісей!

Лікування хворих та ослаблених тварин, і масою тіла до 1 кг повинно ґрунтуватися на оцінці ризику та необхідності лікування.

#### **Застереження**

При обробці тварин уникати попадання препарату в очі, ротову порожнину. Не допускати контакту шойно обробленої тварини з іншими тваринами.

При роботі з препаратом дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

При випадковому попаданні препарату на шкіру, слизові оболонки або очі необхідно ретельно промити їх проточною водою. Власники тварин із гіперчутливістю до складників препарату обробку тварин повинні проводити у гумових рукавицях. Після обробки тварин препаратом не допускати їх до маленьких дітей впродовж 24 годин.

#### **Форма випуску**

Полімерні піпетки по:

0,5 мл - для маленьких собак масою тіла до 4 кг;

1,0 мл - для середніх собак масою тіла від 4 до 10 кг;

2,0 мл - для великих собак масою тіла від 10 до 20 кг;

3,0 - для дуже великих собак масою тіла від 20 до 30 кг.

Полімерні піпетки упаковані у картонні коробки по 1 та 4 шт.

#### **Зберігання**

Зберігати препарат у сухому, недоступному для дітей та тварин, місці окремо від харчових продуктів та кормів за температури від 0 до 30°C.

**Термін придатності** 3 роки.

***Для застосування у ветеринарній медицині!***

#### **Власник реєстраційного посвідчення**

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»,

вул. Полтавський шлях, м. Харків, 61093, 115, Україна.

#### **Виробник готового продукту**

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»,

вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, Україна.