

СЕКСТОП таблетки
(таблетки)
листівка-вкладка

Опис

Таблетка від білого до кремового кольору зі специфічним запахом.

Склад

1 таблетка (490 мг) містить діючу речовину:

мегестролу ацетат - 5,0 мг.

Допоміжні речовини: мікрокристалічна целюлоза, лактоза моногідрат, крохмаль картопляний, повідон К-3, кальцію стеарат.

Фармакологічні властивості

ATC vet QG03, гормони статевих залоз і ветеринарні препарати, які застосовують при патології статевій сфері (QG03AC05, мегестрол)

Діючою речовиною препарату є синтетичний прогестаген - мегестролу ацетат, високоефективний синтетичний прогестероноподібний гормон. Він діє на гіпоталамо-гіпофізарну систему, блокує секрецію гонадотропних гормонів аденогіпофізу. Зниження рівня гонадотропних гормонів (ФСГ і ЛГ) у крові призводить до порушення фолікулогенезу у самок і синтезу тестостерону у клітинах Лейдега у самців, внаслідок чого відбувається пригнічення статевого потягу у тварин.

При застосуванні препарату до початку тічки у самок спостерігають пригнічення секреції гонадотропних гормонів, що попереджує овуляцію. Якщо препарат застосовують на початку фолікулярної фази (другий чи третій день тічки), це призводить до переривання тічки.

Мегестролу ацетат виявляє таку ж дію, як і інші прогестагенні препарати. Має суттєву антиестрогенну та антиглюкокортикоїдну активність.

Препарат добре абсорбується зі травного каналу, метаболізується у печінці і виводиться з організму, в основному, із сечею протягом 1-2 діб.

Застосування

Препарат має антиестрогенну і антиовуляторну дії і застосовується для затримки або переривання тічки у сук і кішок, не впливаючи негативно на наступні вагітності. У кобелів і котів препарат гальмує статеву активність і регулює їхню поведінку.

Дозування

Перорально з кормом або примусово на корінь язика:

Коти:

- для заспокоєння при статевому збудженні - 1 таблетка щодобово, протягом 3-5 діб.

Кішки:

- для попередження тічки - 1 таблетка на 10-14 діб. Після припинення застосування препарату тічка настає через 14 діб;
- для припинення тічки - 1 таблетка щодобово, протягом 3-5 діб (з моменту

прояву ознак статевого збудження);

- як контрацептив - 3 таблетки протягом доби після парування.

Суки:

- для попередження тічки - 1 таблетка на 10 кг маси тіла тварини один раз на 14 діб; після припинення застосування препарату тічка настає через 21 добу;
- для припинення тічки - 1 таблетка на 10 кг маси тіла тварини протягом 7 діб (з моменту прояву ознак статевого збудження);
- як контрацептив - 2 таблетки на 5 кг маси тіла тварини щоденно протягом 2 діб після парування.

Кобелі:

- для заспокоєння при статевому збудженні - 1 таблетка на 10 кг маси тіла тварини щодобово протягом 5 діб.

Протипоказання

Препарат не застосовувати тваринам із захворюваннями статевієї системи (піометра, метрит, ендометрит), при пухлинах молочної залози, при діабеті, нестатевозрілим тваринам, вагітним і лактуючим тваринам.

Не застосовувати молодим самкам до першої тічки або як анестральну терапію при порушеннях статевих циклів.

Не застосовувати при підвищеній чутливості тварин до компонентів препарату!

Застереження

Препарат застосовувати тваринам під наглядом лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Блістери по 10 таблеток, блістери запаковані у картонні коробки по 1 або 5 штук.

Зберігання

Зберігати препарат у сухому темному недоступному для дітей і тварин місці окремо від продуктів харчування та кормів за температури від 4 до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Полтавський шлях, 115, м. Харків, 61093, Україна

Виробник готового продукту

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Зернова, м. Харків, 4, 61105, Україна